

Трухачёв Ф.М., Васильев М.М., Петров О.Ф., Севрюгов Е.Ю.

Анализ пыле-акустических солитонов с учётом самосогласованного заряда пылевых частиц с использованием рядов Тейлора и функции Ламберта

- [1] А Н Щуров, В И Николаев, В М Колотыркин и др. // Журнал физической химии. — 1979. — Т. 53. — С. 930.
- [2] В Е Фортов, А Г Храпак, С А Храпак и др. // УФН. — 2004. — Т. 174. — С. 495.
- [3] О Ф Петров, Ф М Трухачев, М М Васильев, Н В Герасименко // ЖЭТФ. — 2018. — Т. 153. — С. 1012.
- [4] Трухачев Ф М, Томов А В // Космические исследования. — 2016. — Т. 54. — С. 377.
- [5] Ф М Трухачев, А В Томов, М М Могилевский, Д В Чугунин // Письма в ЖТФ. — 2018. — Т. 44. — С. 87.
- [6] Rao N N, Shukla P K // Planet Space Sci. — 1990. — Vol. 38. — P. 543.
- [7] Shukla Padma, Mamun Abdullah. Introduction to Dusty Plasma Physics. — IOP Publishing Ltd., 2002.
- [8] Ma J X, Liu J // Phys. Plasmas. — 1997. — Vol. 4. — P. 253.
- [9] M S Barnes, J H Keller, J C Foster et al. // Phys. Rev. Lett. — 1992. — Vol. 68. — P. 313.
- [10] Boyd J P // Appl. Math. Lett. — 1998. — Vol. 11. — P. 27.